

BETROUBARE PARASIEETBEHEER VIR BEESTE

Spruit onderhuids
of binnespiers in teen
1 ml per 50 kg liggaamsmassa



INWENDIGE PARASIEETE

| | ONVOLWASSE | VOLWASSE | NAWERKING (DAE) |
|---|------------|----------|-----------------|
| HAARWURM (<i>Haemonchus placei</i>)* | ✓ | ✓ | 35 |
| BRUINMAAGWURM (<i>Ostertagia ostertagi</i>)* | ✓ | ✓ | 35 |
| BANKROTWURM (<i>Cooperia</i> spp.) | ✓ | ✓ | 28 |
| HAAKWURM (<i>Bunostomum phlebotomum</i>) | ✓ | ✓ | 42 |
| KNOPPIESWURM (<i>Oesophagostomum radiatum</i>) | ✓ | ✓ | 49 |
| LONGWURM (<i>Dictyocaulus viviparus</i>) | ✓ | ✓ | 21 |
| OOGWURM (<i>Thelazia</i> spp.) | | ✓ | |
| LANGNEK BANKROTWURM (<i>Nematodirus</i> spp.) | | ✓ | |
| WIT BANKROTWURM (<i>Strongyloides papillosus</i>) | | ✓ | |
| SPOELWURM (<i>Toxocara vitulorum</i>) | | ✓ | |
| VALS KNEUSING (<i>Parafilaria bovicola</i>) | | ✓ | |

UITWENDIGE PARASIEETE

DOOD: Suigende luise, Bytende luise, Velpapies of beesvlieë, Skurfte myte, Sandtampanne, Beesspykerwurm, Bloubosluike.

Vir die beheer van bloubosluike, behandeling moet elke 42 dae herhaal word.

*insluitende geïnhibeerde larwe

PARASIEETBEHEER STRATEGIE

BEESTE

SUIPKALWERS

... **5/6 maande** om maksimum groei en speengewig te verseker

MET SPEEN

... om kalwers skoon te maak van somer interne/eksterne parasiete om gewigsverlies gedurende die winter te beperk

VOLWASSE BEESTE

... **einde herfs** - om hul skoon te maak van somer interne/eksterne parasiete

... **lente/voor paar** - om melkproduksie te optimaliseer (kalwers groei beter) en kondisie vinniger te herstel vir beter konsepsie

SKAPE

ALLE SKAPE WAT GESPEEN IS

... **gedurende wintermaande** as 'n alternatief vir bekdosering:

- om **geïnhibeerde larfstadiums** van rondewurms asook neuswurm te beheer
- vir **skaapbrandsiekte uitbrake** (in die geval van 'n uitbraak: volgens wet, moet twee behandelings gedoen word)

VARKE

SPEENVARKE

... **met speen** om maksimum groei te verseker

SÔE EN BERE

... **behandel 2 tot 4 keer per jaar** om melkproduksie te optimaliseer (klein varkies groei beter) en kondisie vinniger te herstel vir beter konsepsie

VERWYSINGS: 1. Study Report: A pen study to determine and compare the plasma kinetic profiles of a long acting ivermectin formulation and IVOMEC® injectable solution in cattle, October 1997. 2. Lanusse C, Lifschitz A, Virkel G, et al. Comparative plasma disposition kinetics of ivermectin, moxidectin and doramectin in cattle. *J Vet Pharmacol Ther.* 1997;20(2):91-9. 3. Lifschitz A, Virkel G, Sallowitz J, et al. Comparative distribution of ivermectin and doramectin to parasite location tissues in cattle. *Vet Parasitol.* 2000;87(4):327-38.

Virbamec® LA – Ivermektien 1 % m/v, Reg. No. G2885 (Wet 36/1947)
Namibia Reg. No. V01/18.1.2/109 [NSO]

za.virbac.com

Virbac (Pty) Ltd (Reg. No. 1990/003743/07)
Private Bag X115, Halfway House 1685, South Africa
Tel: (012) 657-6000 Fax: (012) 657-6067

© 08/2018 Virbac All rights reserved

Shaping the future of animal health



VIRBAMEC® LA

Die Betroubare Keuse vir
Inwendige en Uitwendige
Parasietbeheer

Shaping the future of animal health




VIRBAMEC LA – DIE 1 % IVERMEKTIEN MET 'N VERSKIL

IVERMEKTIEN

1 % m/v

HOËR PIEK PLASMAVLAKKE 1,2


Hoër plasmavlakke beteken meer aktief beskikbaar om parasiete onder alle omstandighede te dood



Aangepas vanuit Studie Verslag¹ en Lanusse *et al.*²

MEER AKTIEF BESKIKBAAR IN WEEFSEL³

Beter aksie, beter beheer en gesonder diere onder alle omstandighede



BETROUBARE PARASIETBEHEER VIR SKAPE



Spuit slegs **onderhuids** in teen **1 ml per 50 kg liggaamsmassa**

INWENDIGE PARASIETE

| | ONVOLWASSE | VOLWASSE |
|---|------------|----------|
| HAARWURM (<i>Haemonchus contortus</i>) | ✓ | ✓ |
| NOOITGEDACHT WEERSTAND-BIEDENDE HAARWURM STAM (<i>Haemonchus contortus</i>) | | ✓ |
| BRUINMAAGWURM (<i>Teladorsagia</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| BANKROTWURM (<i>Cooperia</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| HAAKWURM (<i>Gaigeria pachyscelis</i>) | ✓ | ✓ |
| KNOPPIESWURM (<i>Oesophagostomum</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| GROOTBEKMAAGWURM (<i>Chabertia ovina</i>) | ✓ | ✓ |
| LONGWURM (<i>Dictyocaulus filaria</i>) | ✓ | ✓ |
| LANGNEK BANKROTWURM (<i>Nematodirus</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| SAMBOKWURM (<i>Trichuris</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| WIT BANKROTWURM (<i>Strongyloides papillosus</i>) | ✓ | ✓ |

UITWENDIGE PARASIETE

DOOD: Skaapbrandsiektemyt, Sarkoptiese skurftemyte, Australiese jeukmyt, Suigende luise, Neuswurm (beheer alle stadia – 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} instar larwes).

SLEUTEL ✓ **Beheer** (≥ 90 % effektief) ✓ **Hulp in die beheer** (60 – 89 % effektief)

BETROUBARE PARASIETBEHEER VIR VARKE EN VOLSTRUISE



Spuit **onderhuids** of **binnespiers** in teen **1 ml per 33 kg liggaamsmassa**

INWENDIGE PARASIETE

| | ONVOLWASSE | VOLWASSE |
|---|------------|----------|
| SPOELWURM (<i>Ascaris suum</i>) | ✓ | ✓ |
| WIT BANKROTWURM (<i>Strongyloides ransonii</i>) | ✓ | ✓ |
| KNOPPIESWURM (<i>Oesophagostomum</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| LONGWURM (<i>Metastrongylus</i> spp.) | ✓ | ✓ |
| SAMBOKWURM (<i>Trichuris</i> spp.) | | ✓ |

UITWENDIGE PARASIETE

DOOD: Suigende luise en Skurftemyte (met 'n nawerking van 56 dae).



Spuit slegs **onderhuids** in. Die aanbevole dosis is **1 ml per 50 kg liggaamsmassa**

INWENDIGE PARASIETE

| | ONVOLWASSE | VOLWASSE |
|---|------------|----------|
| VOLSTRUIS HAARWURM (<i>Libyostrongylus douglassii</i>)* | ✓ | ✓ |